

wild animal driven from its lair. These sheep are frightfully fearless of the precipices ; they appear to have excellently safe feet, and no idea of the extreme danger that surrounds them. That the danger is not ideal is proved by their skeletons, seen bleaching on the sides of the mountain in every direction.

(*To be continued.*)

ART. XI.—*Essay on Parasitic Hymenoptera,*

By A. H. HALIDAY, M.A.

(*Continued from p. 59.*)

Sp. 17. R. Col. decorator. Fem. *Testaceus antennis basi, palpis pedibusque silaceis; puncto verticis thoracisque lituris metathorace abdominisque segmento 1^{mo}. nigris; terebra $\frac{2}{3}$ abdominis longitudine.* (Long. corp. 2; alar. $4\frac{1}{2}$ lin.)

Caput latum, pallide testaceum, puncto vertices nigro, mandibulis apice fuscis : ocelli protuberantes : antennæ corpore longiores, gracieles, 38-articulatæ ; fuscæ, basi subtus, articulis 1^{mo}. 2^{do}. que totis pallide flavis : thoracis dorsum fuscum aut nigricans, plaga media testacea antrorum bifida : sulculi impunctati ante scutellum in depressionem lœvem effusi : scutellum apice rufescens metathorax niger subnitidus, vase punctulatus, pubescens, linea media elevata parum conspicua : pectus testaceum puncto fusco sub alis : abdomen oblongo-ovatum, segmento 1^{mo}. nigro, 2^{do}. 3^{ti}. basi, 7^{mo}. 8^{vo}. ferrugineis, reliquis subfuscis. Segmentum 1^{um}. fere duplo longius quam latius, antrorum sensim attenuatum, nitidum, vase punctato-rugulosum ; reliqua lœvissima : pedes pallide flavescentes, tarsis apice, posticis totis tibiisque iisdem apice subfuscis : alæ longæ, hyalinæ radice et squamulis flavo-ferrugineis, stigmate fusco : stigma elliptico-lanceolatum cubitum perpaulo ante medium excipiens : alæ posticæ areola brachialis-posterior $\frac{1}{2}$ anterioris brevior.

Habitat inter quercus cæduas mihi lectus in convalle *Cartland Craigs* dicta, prope fluenta Cluthæ.

Sp. 18. R. Col. hariolator. Fem. *Testaceus antennis basi, palpis pedibusque silaceis; capite thoracis lituris, metathorace abdominisque segmento 1^{mo}. nigris; terebra $\frac{2}{3}$ abdominis longitudine.* (Long. corp. $1\frac{1}{2}$; alar. $3\frac{1}{3}$. lin.)

Præcedente dimidio minor sed statura et sculptura absolute similis, nisi caput paulo minus videatur: hoc totum nigro-piceum, ore testaceo; pectus fusco-testaceum lineola media punctisque nigris, litura picea insuper sub alis. Tibiae posticæ totæ fuscescentes: reliqua præcedentis.

Habitat in Anglia lectus semel: *F. Walker.*

Sp. 19. R. Col. catenator. Fem. *Niger nitidus antennis basi, palpis, pedibus (abdominisque limbo laterali) silaceis; stigmate fusco; abdominis segmento primo et 2^{di}. basi lineaque hujus apicem definiente rugulosis; terebra $\frac{1}{4}$ abdominis longitudine.* (Long. corp. $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$; alar. $3-3\frac{1}{2}$ lin.)

Caput et thorax lævissima nitida albido-pubescentia. Occipitis margo superus tenuissimus: antennæ circiter 33-articulatae fuscæ basi flavescentes: mesothoracis sulculi subtilissimi impunctati: metathorax declivis crebre punctulatus et pubescens, spatiis nonnullis lævigatis: abdomen thorace paulo longius et vix latius oblongo obovatum: segmentum 1^{mum}. obconicum latitudine apicis fere sesquilonius, circa medium subtiliter tuberculatum rugulosum linea elevata longitudinali antrorum bifurca: segmenta reliqua breviora, longitudine parum decrescentia, 2^{dum}. basi rugosostriatum margine laterali et postico lævigatis, 3^{um}. a secundo linea crenata discretum; reliqua lævissima ante marginem albido-ciliata, margo lateralis segmentorum 2^{de}—5^{ti} flavescit in uno exemplari, in alio vero piceus est: pedes pallide flavescentes tarsis apice, posticis totis subfuscis: alæ hyalinæ radice et squamulis flavo-ferrugineis stigmate fusco nervis pallidioribus: areolæ fere quales binis præcedentibus.

Habitat in Hibernia mihi semel lectus: alterum ex Anglia transmisit *F. Walker.*

Sp. 20. R. Col. funestus. Mas. *Niger palpis pedibusque sordide ochreis; abdominis segmento 1^{mo}. bicarinato, stigmate fusco; nervo recurrente erecto.* (Long. corp. $1\frac{1}{2}$; alar. 3 lin.)

Antennæ corporis longitudine 32-articulatae: palporum labialium articulus 3^{tius}. perparvus: caput, thorax subtilissime punctulati pubescentes: mesothoracis sulci oblitterati: metathorax obsolete areatus abdomen obovatum: segmentum 1^{mum}. basi angulatum dehinc in apicem fere aquilatum, sesquilonius quam latius carinulis duabus retrorsum parum convergentibus interstitiis punctulatis angulis apicis membranaceo marginatis: segmentum 2^{dum}.

basi punctulatum; reliqua lœvia breviora: pedes ochracei aut subfuscæ: alæ hyalinæ stigmae nervisque fuscis: stigma crassum, ovato-lanceolatum, cubitum in medio fere excipiens: nervus recurrentis areolæ cubitali secundæ insertus: alæ posticæ areola brachialis posterior $\frac{1}{2}$ anterioris longitudine. Species loci ambiguæ, etsi longe plurimis notis cum proxime præcedentibus conveniat.

Habitat in Anglia semel lectus. *F. Walker.*

Subgen. X.—CLINOCENTRUS.

Areolæ cubitales tres, 1^{ma}. nervum recurrentem excipiens: abdomen oblongo-ovatum, segmentis 3 anticus magnis subæqualibus, 2^{do}. et 3^{ti}. imperfecte sejuncto, reliquis minutissimis: terebra exerta caput transversum.

Clinocentrus A. H. H., Ent. Mag. I. 266.

Rogas spp. et *Bracon* spp. *N. ab. E.*

Hi transitum parant in *Rogades* genuinos quarum alæ conformatæ sunt modo angustiores, stigma tenuiore: quoad corporis staturam *Clinocentri* breviores sunt, capite latiore, palpis brevioribus, scultura corporis subtiliore, abdominis ambitu subovato, incisura 2^{da}. obsoletiore, terebra longiore. Segmentum 1^{mum}. abdominis in *Rogadibus* prope basin, in his versus medium fert tubercula.

Sp. 21. R. Cl. excubitor. *Niger, ore, orbita, pectore, lineola ante alas pedibusque testaceis; abdominis basin rugulosi segmento 1^{mo}. obconico. Fem. Terebra $\frac{2}{3}$ abdominis longitudine.* (Long. corp. 2, $2\frac{2}{3}$; alar. $4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$ lin.)

Caput nigro-fuscum ore, clypeo, orbita testaceis; palpus pallidioribus: antennæ corporis fere longitudine, circiter 33-articulatae, articulis 2 baseos pallide testaceis: thorax niger, margine prothoracis ante alas pallide ferrugineo; pectus fusco-testaceum: abdomen obovatum nigrum, segmento 1^{mo}. et 2^{do}. rugulosis interstitiis punctatis; 3^{ti}. punctato-ruguloso, margine laterali summo nonnunquam fulvescente; reliquis sublævibus: segmentum 1^{mum}. apice quam basi fere duplo latius, latitudine apicis vix duplo longius, linea media elevata antrorum bifurca: pedes pallide testacei: alæ hyalinæ radice et squamulis pallide testaceis: stigmae fuscescente basi pallido: *maris* abdomen angustius; segmenti 2^{di}. et 3^{ti}. limites adhuc magis deleti; variat hic plagâ sordide rufescente ante scutellum.

Adnot.—Discrimen certissimum a binis sequentibus ex abdominis sculptura rudi.

Habitat in lucis umbrosis Angliae, Hiberniae.

Sp. 22. R. Cl. cunctator. *Niger, ore, orbita, thoracis antici lituris, abdomine postice, pedibusque testaceis; abdominis basin striate segmento 1^{mo}. obconico. Fem. Terebra $\frac{2}{3}$ abdominis longitudine. (Long. corp. 1 $\frac{1}{2}$ —2; alar. 3—4 $\frac{1}{2}$ lin.)*

Precedenti affinis, differt præcipue abdominis sculptura: segmenta 1^{mum}. et 2^{dum}. subnitida sunt concinne striata, interstitiis haud punctatis; reliqua sordide testacea vel fusco inumbrata, 3^{tium}. subtilissime transversim aciculatum, sequentia fere lævigata: venter pallide testaceus: caput testaceum facie sub antennis, verticis medio et occipitis limbo fuscis: thorax antice cum pleuris et pectore testaceus, lituræ tres dorsi confluentes fuscæ: metathorax niger punctato-reticulatus, nec areatus: pedes pallide testacei: alæ hyalinæ stigmate pallide testaceo, apice fuscescente: mas differt abdominis segmentis posterioribus minus abbreviatis et latius lævigatis, nonnunquam alarum nervis exterioribus in-crassatis.

Habitat in nemoribus umbrosis Hiberniae occidentalis minus frequens.

Sp. 23. R. Cl. umbratilis. Fem. *Niger, ore, orbita, pectore, thoracis antici lituris, pedibusque testaceis; abdominis basin striati segmento 1^{mo}. fere linearis; terebra $\frac{1}{2}$ abdominis longitudine. (Long. corp. 2 $\frac{3}{4}$; alar. 5 lin.)*

Præcedenti iterum sculptura similis, sed abdomen longius et angustius; segmentum 1^{mum}. antrorum vix attenuatum, latitudine apicis plus duplo longius: hoc et secundum striata, tertium vase punctatum punctis in strias irregulares subtilissimas, versus latera transversim ductas, diffluentibus, hujus segmenti margo lateralis summus rufescit; dorsum reliquum nigro-fuscum; ventertestaceus.

Habitat, cum præcedentibus, semel lectus.

Sp. 24. R. Cl. vestigator. *Niger, ore, orbita, pedibusque testaceis; abdominis basi rugulosa; mas stigmate toto fusco. Fem. Terebra $\frac{1}{3}$ abdominis longitudine. (Long. corp. 1 $\frac{1}{2}$ —2; alar. 3—4 lin.)*

Præcedentibus brevior, metathorace crassius rugoso: antennæ, 27-articulatæ: abdomen brevius ovatum segmentis 2 anticis, nonnunquam 3^{ti} basi, rugulosus; reliquis laevigatis, nigro, piceis; terebra *feminæ* quam illis plus duplo brevior, validior, subclavatus: alæ hyalinæ, stigmate paulo crassiore, fusco basi pallido, in *mare* toto nigro-fusco.

Variat abdominis segmento 3^{do}. lateribus testaceo, medio fusco.

Variat—*Mas* scutelli apice fusco.

Variat—*Mas* sculptura subtiliore, capite nigro facie pallide testacea.

Habitat Angliam, Hiberniam, cum præcedentibus; minus frequens.

Adnot.—In hoc subgenus referendi sunt præterea.

Rogas exortor, N. ab E. Monogr. I. 207. No. 10, (quem ne cum specie nostra 23^{ta}, conjungerem obstitit rubedo clara pedum,) et *Bracon orbitator*, ibid. 91. No. 52, Species Italica a Specie 21^{ma}. thorace toto nigro; a Sp. 24^{ta}. terebræ longitudine discrepans.—Etiam *Rogas luteus*, N. ab E. Mon. 218. No. 26, propter segmenta 2^{dum}. et 3^{tium}. fere, connata et terebram exertam transitum ex his in *Rogades Genuinos* perducere videtur.—*Bracon unicinctus* vero Spinolæ, (Ins. Lig. II. 130. No. 19), qnem Neesius cum *R. exortore* conjunxit, *Rogas Genuinus* foret ni fallor, propter segmenta anteriora abdominis medio carinata.

Subgen. XI.—ROGAS.

Areolæ cubitales tres 1^{ma}. *nervum recurrentem excipiens*; *brachialis posterior anteriorem longe superans*; *stigma lanceolatum*: *abdomen oblongum sessile*, *segmentis 3 anticis subæqualibus discretis*, *reliquis brevissimis*; *terebra recondita aut subexerta*.

Rogas *Curt. Br. Ent.* 512.

— *A. H. H. Ent. Mag.* I. 266.

**Rogas*, Sect. II. Gasteratores, *N. ab E. Act. Acad.* IX. 306.

— *Monogr.* I. 199. 206.

Bracon, Fam. III. *Genuini* — *Berl. Mag.* V. 30.

Bracon, Fam. II. *Spin. Ins. Lig.* II. 120.

Schizodes *Wesm. Mon. Brac. Belg.* 171.

Bracon, Spp. *Jurine.*

Bassus, Spp. *Fabr.*

Ichneumon, Spp. *Fabr.*

Corpus in his fere lineare, nusquam coarctatum: caput thoracis vix latitudine transversum, occipite parvo acute marginato, oculis

prominulis : antennæ corporis longitudine articulis flagelli plurimis, breviusculis, arete contiguis : mandibulæ perbreves trigonæ porrectæ : labrum elongato-trigonum, epipharyngis apice angulum anticum truncatum reficiente : palpi longiusculi, labialium articuli exteriore longitudine subæquales : thorax subcylindricus, mesothoracis sulculis inconspicuus ; metathorace haud distincte areato, linea media elevata : abdomen lineare aut linearis-ovovatum ; segmenta tria anteriora majora, longitudine plerunque decrescientia et latitudine crescentia, saepe exculpta et linea media elevata ; 2^{dum}. a 3^{to}. linea profunde incisa sejunctum ; reliqua brevissima cito decrescentia : terebra recondita aut subexerta : stigma lanceolatum est, cubitum in medio plerumque recipiens, nervus recurrens areolæ 1^{ma}. cubitali insertus longe ante apicem ; areola brachialis-posterior anteriorem longe superat (ut in *Microgastre*) ideoque postica disci multo brevior est in anticâ : nervus recurrens alæ posticæ perparvus saepe evanescit : species plerumque majores sunt ut in hoc Genere et inter nostrates. De vita et indole nil fere traditum est. Species quædam e larva *Zygænæ Filipendulae* Neesio prodibat.

SECTIO A. *Areola cubitali 2^{da} oblonga.*

Sp. 25. R. rugulosus. *Niger* : *pedibus crassis rufis, tibiis posticis pallidioribus, apice tarsisque iisdem totis nigris* ; *abdomine antice attenuato, postice lœvissimo nitido*. (Long. corp. 3 $\frac{1}{4}$ —3 $\frac{2}{3}$; alar. 5 $\frac{1}{2}$ —7 lin.)

Rogas rugulosus, *N. ab. E. Monogr.* I. 209. No. 13.

*Bracon id. — Berl. Mag. V. 32. No. 49.

Antennæ plusquam 50-articulatæ nigræ : palpi nigro-fusci aut rufo-picei : thorax subtiliter confertim punctulatus : metathorax punctulato rugulosus : abdomen antrorsum magis attenuatum quam sequentibus ; segmenta posteriora et etiam minus abbreviata sunt, postrema vero in *femina* compressa : segmenta 1^{num}. et 2^{dum}. striata sunt et inter strias punctulata 3^{tiuum}. basi tantum intricatum punctatum, hoc apice et reliqua lœvissima nitida vase pubescentia : pedes validi sunt tarsique breviores et crassiores quam in ulla alia specie : coxae omnes rufæ ; femora postica apice subinfuscata : tarsi anteriores apice, postici totis cum apice tibiarum earundem nigri : alæ solito majores hyalinæ cinerascentes, radice et squamulis ferrugineis, vel harum puncto fusco, nervis et

stigmate fuscis : stigma apice solito magis attenuatum ; areola radialis angustior : nervus brachiali-recurrens anterior valde obliquatus est : nervus recurrens alæ posticæ fere deletus : maris abdomen gracilis apice lenius attenuatum.

Var. a.—Abdomine toto nigro.

Var. β.—Litura picea, mox in fasciam rufam ampliata segmenti 1^{mi}. apicem 2^{dum}. vero totum ad summum occupante.

Var. γ.—Segmentis 1^{mo}. et 2^{do}. totis clare rufis.

Habitat Germaniam N. ab E.—Angliam, Hiberniam, autumno non infrequens.—Apricatur in umbelliferis.

Adnot.—Sculptura hujus subtilior est quam cæteris nostratisbus.^a

Sp. 26. *R. nobilis*. *Niger abdominis segmentis 1^{mo}. 2^{do}. et 3^{ti}. basi rufis; reliquis nigris, dense flavo-hirtis vitta media et margine nitidis: pedibus rufis, femoribus tibiisque posticis tarsisque apice nigris.* (Long. corp. 2 $\frac{4}{5}$; alar. 5 lin.)

R. nobilis. *Curt. Br. Ent.* 512. No. 8.

Antennarum scapus niger, flagellum piceo-rufum apice nigricans : os rufo-ferrugineum, palpi pallidiores : collare et propectus, abdominis segmenta 1^{mum}. 2^{dum}. et 3^{ti}. basis, pedesque rufo-ferruginei ; segmentum 1^{mum}. base nigro-maculatum, segmenta posteriora citius abbreviata quam præcedenti, confertissime punctulata villis densis flavis decumbentibus obiecta, margine postico segmenti singuli et vitta longitudinali lævi intente : pedes per paulo

^a Sp. 25.^b *R. tricolor*. *Rufus, metathorace, antennis pedibusque nigris; abdominis segmentis 1^{mo}. et 2^{do}. albis basi nigro-maculatis, reliquis nigris margine albo; alis fuscis basi subhyalinis.* (Long. corp. 3 $\frac{1}{2}$; alar. 7 $\frac{1}{2}$ lin.)

Caput, thorax antice, cum pleuris et pectore lævissima nitida rufa : mandibulæ apice nigro-piceæ, palpi picei basi rufi : antennæ circiter 66-articulatæ, nigræ: metathorax rotundato declivis, subtiliter punctulatus, niger nitidus: abdomen thoracis latitudine ; segmentum primum, antrorsum sensim attenuatum et secundum punctulata, linea media elevata, alba illius macula magna scutiforme baseos, hujus macula multo minora nigra ; segmenta reliqua nigra margine postico albo: venter albus, segmentorum 1^{mi}. et 2^{di}. macula communis nigra utrinque, 3^{ti}. macula magna biloba, reliquis basi nigris: pedes nigri : alæ fuscae, basi subhyalinæ, nervis fusco-limbatis, stigmate fusco, radice et squamulis pallide rufis : areolæ fere ut in nostratisbus antica disci parum remota : terebra recondita.

Habitat Australasiæ: communicavit F. Walker.

Adnot.—Propter sculpturam læviorem quam in nostratisbus, hæc species primo aspectu pro *Bracone* accipi posset, a quo genere tamen longe distat.

graciliores quam praecedentis, validiores quam reliquis : tarsorum articulus ultimus tantum niger, etiam femorum et tibiarum posticorum apex : alæ breviores, cinerascenti-hyalinæ radice et squamulis flavo-ferrugineis nervis stigmateque fuscis : areolæ fere ut in praecedente : alæ posticæ nervus recurrens obsoletus.

Habitat in Hibernia boreali mihi semel lectus.

Sp. 27. R. gasterator. *Niger abdominis 1^{mo}. et 2^{do}. segmento, 3^{ti}. basi pedibusque rufis; abdominis apice lævi nitido.* (Long. corp. 3—3½; alar. 5½, 5¾ lin.)

Rogas Gasterator . . . *N. ab E. Monogr. I. 212. No. 18.*

*Bracon id. *Jurine, Hym. Tab. VIII. Fig. 5.*

Id. id. *Var. III. Spin. Ins. Lig. II. 121. No. 14.*

Femina sola quæ adest differt a plerisque sequentibus tarsis brevioribus crassioribus : mandibulæ rufæ sunt, palpi picei apice rufi : antennarum flagellum basi piceo-rufum : collare rufum : abdominis segmenta anteriora rugulosa, 1^{mum}. et 2^{dum}. tota, 3^{tium}. basi rufa ; reliqua nigra nitida subtilissime punctulata flavo-pubescentia in apicem rotundatum eito abbreviata : pedes rufi, tarsorum apice solo fusco : alæ subhyalinæ radice et squamulis ferrugineis, stigmate flavo-testaceo apice infuscato.

Mas ab *F. Walker* transmissus e Gallia meridionali congruit quidem abdominis apice lævi sed in multis discrepat : thorax niger : abdominis segmenta 1^{mo}. 2^{dum}. tota, 3^{tium}. basi rufa : pedes rufi, coxis et trochanteribus superis, femorum et tibiarum posticorum apice nigris, tarsis fuscis : alæ ut in sequente.

Habitat Italiam, Germaniam, Helvetiam. *Auctt.*

Sp. 28. R. geniculator. *Niger abdominis segmento 1^{mo}. apice 2^{do}. toto, 3^{ti}. basi rufis; pedibus rufis; abdominis apice punctulato.* (Magnitudo praecedentis.)

*Rogas geniculator. . . . *N. ab E. Monogr. I. 211. No. 16.*

Bracon rugulosus, *Var. β.* — *Berl. Mag. V. 33.*

Hujus tantum bina exemplaria vidi, quæ praecedenti perquam similia, tarsis longioribus, abdominisque apice subopaco discrepant : *mares* ambo in altero : segmenta 1^{mum}. et 2^{dum}. rufa sunt, illius tantum maculæ baseos nigra, 3^{ti}. basis concolor : pedes rufi, coxis anticis basi, femoribus tibiisque posticis apice nigricantibus ; tarsi fusi annulis rufescensibus : palpi picei : alæ

fumato hyalinæ radice ferruginea, squamulis subfuscis stigmate brunneo puncto baseos pallidiore areola cubitalis 2^{da}. brevior quam in *R. ruguloso*: in altero segmenti 1^{mi}. margo posticus et 2^{dum}. totum rufa sunt, reliqua nigra: pedes rufi, coxis anticis totis, femoribus tibiisque posticis apice, tarsisque nigris: palpi picei.

Habitat Italiam, Germaniam N. ab. E. Ubique rario esse videtur: exemplar in Cæsaria Insula, et alterum in Anglia lectum transmisit F. Walker.

Adnot.—De tribus proxime præcedentibus quid dicam nescio: mirum foret unam speciem tantas formæ, coloris et sculpturæ mutationes subire: itaque seorsim exhibui in præsens, dum melior copia exemplarium dubia solvat.

Sp. 29. *R. alternator*. *Rufus, capite, thorace et abdomine postice, pedumque posticorum geniculis nigris; abdominis apice punctulato.* (Long. corp. 3; alar. 5½ lin.)

*Rogas alternator. *N. ab E. Monogr. I. 213. No. 20.*
— balteatus. *Curt. Br. Ent. No. 12 et Fig.*

Caput cum antennis nigrum, orbita postica et scapi basis piceæ, palpi nigro-picei (secundum *Neesium testacei*): thorax rufo-testaceus, scutelli apice, metathoracis dorso et pectore nigris: abdomen oblongum, nec basi attenuatum, segmentis anterioribus rugulosis linea media elevatâ, posterioribus punctulatis; 1^{mo}. et 2^{do}. rufo-testaceis, illius basi nonnunquam nigro-maculata: 3^{tiuum}. vel basi rufescens, vel totum nigrum: pedes quam præcedentibus graciliores, sed validiores quam *R. testaceo*, rufo-testacei; femorum et tibiarum apice (saltem posticorum,) tarsisque fere totis fuscis: alæ cinerascentes nervis fuscis.

Habitat Germaniam N ab. E.—Hiberniam borealem.

Sp. 30. *R. bicolor*. *Niger, capite, thorace antice, pedibusque rufis; abdominis punctulati, basin rugulosi, lateribus subsinuatis.* (Long. corp. 2½—3¼; alar. 4½—5½ lin.)

Rogas bicolor. *N. ab E. Monogr. I. 213. No. 21.*
*Bracon id. *Spin. Ins. Lig. II. 128. No. 18.*

Sculptura hujus crassior: metathorax reticulatus linea elevata distinctiore: abdomen late rugulosum, apice punctato opacum,

basi nonnil attenuatum, incisuris coarctatis (3^{ta}. præsertim;) segmentis intermediis utrinque prope stigmata leviter foveolatis postremis valde abbreviatis; linea elevata media usque in 3^{tiūm}. continuata: terebra subexerta: colores variant ultra modum: in *Genuinis feminis* rufa sunt caput, thorax antice cum scutello, pedesque; nigræ antennæ, pectus, metathorax et abdomen: tarsi, et nonnunquam genua postica, fuscis: alæ obscure hyalinæ, nervis fuscis, stigmate fusco-ferrugineo, basi pallescente; in *mare* præterea nigra sunt vertex medio cum genis, et scutellum.

Var. β.—Niger, ore, orbita, thoracis antici lineis, pedibusque rufis; femoribus tibiisque posticis apice fuscis; coxis posticis rarius basi nigris.

Var. γ.—Niger, ore, orbitaque rufescensibus; pedibus rufo-testaceis, posticorum geniculis tarsisque fuscis.

Rogas ater. *Curt. Br. Ent.* 512. No. 1.

Var. δ.—Orbita postica vix rufescens; reliqua *Var. γ.*

Rogas prærogator. *N. ab E. Monogr.* I. 219. No. 27.

Bracon id. ————— *Berl. Mag.* V. 33. No. 52.
(*Synon. demt.*)

Var. ε.—Niger, ore, orbita, prothoracis lituris, lineola sub scutello, abdominis segmenti 1^{mi}. lateribus et apice, 2^{do}. toto, 3^{ti}. basi, pedibusque rufis.

Variat insuper (Spinola teste) abdominis dorso postice rubescente, vel etiam abdomine toto rubro.

Habitat Italiam, Germaniam, *Auctt.*—Angliam, Scotiam, Hiberniam, minus frequens: in arenis maritimis ut plurimum mihi obvius.

Sp. 31. R. testaceus. *Colore mutabilis, pectore semper testaceo; pedibus pallide testaceis, vel fusco-annulatis.* (Long. corp. 2¹—3¹; alar. 4—6 lin.)

Rogas testaceus. *N. ab E. Monogr.* I. 215. No. 24.

Bracon id. ————— *Berl. Mag.* V. 34. No. 53. Tab.
II. Fig. 9.

Id. id. *Spin. Ins. Lig.* II. 131. No. 20.

Bassus id. *Fabr. S. P.* 101. No. 31.

**Ichneumon* id. *Fabr. E. S. Suppl.* 228. No. 189.

R. circumscriptus. *N. ab E. Monogr.* I. 216. No. 25.

<i>Var. a.</i>	R. ochraceus.	.	<i>Curt. Br. Ent.</i> 512. No. 4.
<i>Var. η.</i>	R. similis	.	No. 6.
<i>Var. γ.</i>	R. subucola.	.	No. 5.
<i>Var. θ.</i>	R. spathuliformis.	.	No. 11.

Recedit hic nonnil a reliquis (transitum in *Clinocentros* parans,) antennarum articulis paucioribus, nec tam arce contiguis, palpis brevioribus, pedibus gracilibus, alis amplis, stigmate crassiore, areola disci antica parum remota, cubitali media longiore. Sunt vero valde inconstantes magnitudine, colore et forma, namque exemplaria majora, longiora, metathorace subcylindrico, antennarum articulis pluribus, *R. testaceum* N. ab E. exhibent; minora vero, metathorace rotundato-declivi, antennis brevioribus, articulis paucioribus, *R. circumscriptum* ejusdem quae tamen sensim confunduntur nec colorum legem quam ille expressit servant.

Antennæ corporis longitudine vel paulo breviores, 33—48-articulatæ: metathorax punctulatus, lineola elevata tenui: abdomen basi nonnil attenuatum, antrorsum subtilissime striolatum, postice lœvigatum: alæ latiores unde plura discrimina a congeneribus oriuntur; præsertim vero alæ posticæ areolæ brachiales latiores, nervus recurrens disci distinctus.

Var. a.—Flavo-testaceus, antennis apice puncto verticis tantum fuscis; pedibus pallidioribus; stigmate concolore.

Var. β.—Flavo-testaceus, stigmate fusco basi puncto pallido.

Var. γ.—Testaceus metathorace abdominisque segmento 1^{mo}. fuscis; stigmate flavo-testaceo immaculato, vel litura subfusca.

Var. δ.—Segmenti 2^{di}. lateribus insuper fusco-limbatis.

Var. ε.—Metathorace, abdominis basi, limbo et apice fuscis.

Var. ζ.—Verticis medio, thoracis antici lituris fuscis; reliquæ ut in *Var. γ.*

Var. η.—Segmento 2^{di}. limbo lateralí insuper fuscescente.

Var. θ.—Fuscus, ore, orbita, thoracis antici lineis, scutelli apice, pectore, abdominis plagâ oblongâ mediâ, pedibusque testaceis.

Var. ι.—Femoribus posticis extrorsum late fuscis, nonnunquam mediorum et tibiarum posticarum apice fuscescente; reliqua ut *ζ.*

Var. κ.—Pedes ut in *Var. ι.*, reliqua *θ.*

Habitat passim per Europam; in Hibernia obvius per æstatem totam et usque in finem Octobris: nusquam frequentiores vidi quam indumentis rupestribus ad litora insulæ Sciæ, Angusto mense.

SECT. AA.—*Areola cubitali media breve trapeziformi.*

Sp. 32. R. dispar. Fem. *Rufus capite, thorace antice, abdomine postice nigricantibus; antennis tricoloribus; alis cinereis lineola hyalina.* Mas. *Testaceus, thoracis lituris abdominisque dorso subfuscis; antennis gracillimis; alis glauco-hyalinis.* (Long. corp. 3; alar. 5 lin.)

Rogas dispar. *Curtis, Br. Ent.* 512. No. 10.

Statura gracilis corpus *feminæ* totum fere punctis elevatis scabrum et opacum: caput solito minus oblatum fronte protuberante: antennæ corpore paulo breviores quam in reliquis validiores fere ad $\frac{1}{3}$ longitudinis rufæ, deinde fuscæ, articulis 15^{mo}.—19^{no}. albis: mandibulæ ferrugineæ; palpi albidi basi fusti: thorax antice cum scutello nigricans: mesothoracis sulculi obliterate: metathorax cylindricus et prope foramen apicale denticulo minuto auctus, rufus: abdomen a basi angusta in apicem segmenti 3^{ti} recta dilatatum tum reliqua sub hujus margine retracta, apiculam parvam rotundam niembranaceam tantum exhibentia: segmenta 2 anterius rufa, lineâ mediâ elevatâ, punctato-rugulosa: 3^{ti}um. confertim punctatum nigrum: pedes quam in præcedente parum validiores, rufescentes, femoribus apice fuscis, trochanteribus omnibus et coxis anterioribus, posticis modo subtus, pallidis: alæ anticae fusco-cinereæ stigmate flavo apice fusco, nervis nonnullis areæ cubitalis lineolâ hyalinâ signatis sub stigmate alæ posticæ subhyalinæ.

Mas longior; caput latius, fronte non protuberante: antennæ corpore fere longiores, graciliores quam in ullo alio ex *Ichneumonidis*, fuscæ basi rufescentes: capitum thoracisque sculptura multo subtilior quam *feminæ*: color testaceo fuscoque mixtus: metathorax et abdominis dorsum fusca: abdomen angustum lineare: segmentum 1^{mum}. basi sensim attenuatum 2^{dum}. et 3^{ti}um. subtiliter rugulosa, linea media elevata tenui: 4^{ti}um. 3^{ti}o. dimidio brevius confertim punctatum; reliqua fere retracta lævia: pedes prælongi et gracillimi, pallide testacei unguibus crassiusculis fuscis: alæ glauco-hyalinæ radice et squamulis ferrugineis, stigmate flavo apice infuscato fascia pallida sub stigmate; areolæ alarum satis convenient in utroque sexu stigma quam reliquis tenuius: cubiti abscissa 1^{ma}. 2^{da}. longior, quod valde insolitum: areola cubitalis 2^{da}. brevis trapeziformis, antrorum valde attenuata nervo anteriore interioris longitudinem vix æquante: cubitalis 3^{ta}. prælonga; antica disci parum remota:

areolæ posteriores angustiores brachiales solito minus elongata: alæ posticæ brachialis vix $\frac{1}{2}$ anterioris longitudine, nervus recurrens manifestus.

Habitat in pinetis Hiberniæ borealis et Scotiæ, Augusto mense at infrequens.—Etiam in Anglia lectus. *J. C. Dale.*

Supersunt tres species Europæ septentrionalis incolæ, sed intra fines Britanniae hactenus non inventæ quantum mili innotuit.
 1. *R. dissecator*, N. ab E. Mon. I. 208, No. 11.—2. *R. signatus*, ibid. 210, No. 15, qui forsitan inter varietates *R. bicoloris* annumerandus erit.—3. *R. Zygænæ*, ibid. 210, No. 14, a varietate nigra ejusdem ut videtur sculpturâ longe subtiliore discrepans.—Species reliquæ Cisalpinæ sunt neque sperandæ sub nostro cœlo.
 4. *R. reticularis*, ibid. 211, No. 17.—5. *R. cruentus*, ibid. 212, No. 19.—6. *Bracon coxalis*, Spinola, Ins. Lig. II. 126, No. 17.—7. *Br. unicinctus*, ibid. 130, No. 19.—8. *Br. dimidiatus*, ibid. 123, No. 15, qui nostro *R. dispari* affinis videtur.

Rogas luteus, N. ab E. Mon. I. 218, No. 26, propter sculpturam thoracis et incisuram abdominis 2^{dam}. imperfectam dubius est etiam *Bracon bifasciatus*, Spin. Ins. Lig. II. 125, No. 16, pulchra species post Spinolam nemini visa, pro *Rogade* genuino vix accipi potest ob terebram longiorem.

Subgen. XII.—ADEMON.

Areolæ cubitales tres; radialis apice incompleta; stigma tenuissimum: alæ posticæ nervus recurrens disci nullus. Abdomen sessile oblongo-lanceolatum segmentis 2^{do}. et 3^{to}. discretis, posterioribus brevissimis, terebra recondita, antennæ pedesque gracillimi, feminæ ungues elongati.

Ademon A. H. H. Ent. Mag. I. 266.

Rogas, Sectio III. decrescentes, N. ab E. Act. Acad. IX.

Monogr. I. 220.

*Bracon, Fam. III. Heterocl. A. —— Berl. Mag. V. 34.

Sp. 33. R. A. decrescens. *Abdominis segmento 3^{to}. transversim carinato.* (Long. corp. 1—1 $\frac{3}{4}$; alar. 2 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{2}$ lin.)

Rogas decrescens, N. ab E. Monogr. I. 220, No. 28.

*Bracon id. —— Berl. Mag. V. 35, No. 55.

Rogadibus Genuinis statura satis similis. Caput transversum, latitudine thoracis, rugosum, occipite lato hujus et genarum finibus acute prominulis; oculi prominuli: antennæ corpore breviores,

21—27-articulatæ flagelli articulis interioribus prælongis, exterioribus cito decrementibus : articulus ultimus penultimo non longior, 3^{tius}. quatuor ultimis æqualis. Oris partes fere quales in Subgenere præcedente : palpi paulo breviores, maxillarum articulus 4^{tius}. ratione reliquorum magis elongatus ; labialium articuli exteriore ovati, decrecentes. Thorax oblongus scabriculus, collari brevi porcato ; mesothoracis lobo medio canaliculato et utrinque carinula seu plica elevata antrorum angulata instructo ; fovea porcata scutelli basin sejungente ; metathorace truncato, crasse rugoso-reticulato : abdomen *feminae* subconvexum, oblongo-ovatum, segmentis 1^{mo}. 2^{do}. longitudine paribus sed antrorum attenuatis, dense punctato-scabris ; 3^{tiuum}. 2^{do}. duplo brevius, punctatum margine postico lævi depresso carinulam transversam fingente, 2^{dum}. a 3^{ti}. linea arcuata profunde impressa sejunctum : reliqua brevia linearis-transversa, lævia vel 4^{tum}. basi punctulatum ; ultimum minutum conicum terebra recondita : pedes prælongi et graciles unguibus in *femina* elongatis : alæ angustæ, stigmate tenuissimo cuneiformi, cubitum ultra medium excipiente : nervus recurrens apiei areolæ cubitalis 1^{mæ}. insertus : cubitalis 2^{dæ}. nervus anterior interiore non longior : nervi longitudinales ante marginem alæ evanescunt, ideoque areola radialis apice incompleta est ; brachialis posterior anteriore parum longior : alæ posticæ perangustæ nervo disci recurrente nullo, areola brachiale posteriore $\frac{1}{3}$ anterioris longitudine.—*Maris* sculptura sæpe subtilior, abdomen subdepressum, longius, segmentis posterioribus minus abbreviatis, 3^{ti}. que læviore.

Variat quam maxime coloribus, ut varietates terminis nullis nec numero compescendæ sint. Commemorabo insigniores in serie dupli.

—1º. Alæ fumatæ stigmate nervisque fuscis : corpus nigrum abdome postice nonnunquam piceo ;—*mares*, *feminæque*.

Var. a..—Pedes nigro-fusci trochanteribus dilutioribus aut flavis, in aliis insuper tibiarum et tarsorum basi dilutius fuscis.

Var. β..—Coxæ femora et tibiarum basis fusco-ferrugineæ ; vel pedes ferruginosi, tibiis tarsisque apice fuscis.

Var. γ..—Prothoracis macula laterali rufa ; reliqua *Var. a.*

—2º. Alæ flavicantes basi et apice subfuscæ, stigmate flavo, nervis extrorsum depallescensibus. — Nullus *mas* in hac serie mihi obvius fuit.

Var. δ..—Niger prothorace rufo, segmentorum 3^{ti}. 4^{ti}. margine postico et sequentibus piceis : pedes nigro-fusci trochanteribus flavis, tibiis basi, tarsis fere totis ferrugineis.

Var. ε.—Niger, thorace antice abdominis segmento 4^{to}. et sequenti- bus rufis, femora nigro-fusca, tibiæ fuscæ, coxæ tarsique fere toti ferruginei, femora apice et tibiæ basi flavæ, in aliis litura rufa occipitis et alia sub antennis.

Var. ζ.—Rufus, vertice, metathorace, abdominis segmento 1^{mo}. nigris : antennæ nigrae : pedes fusci, coxis, femorum apice, tibiarum basi tarsisque late flavo-testaceis ; trochanteribus flavis,— in aliis metathorax et segmentum 1^{mum}. tantum medio infuscata sunt,—in aliis color abdominis pedumque magis flavo-testaceus, femorum posteriorum ima basi, tibiis tarsisque apice fuscis.

His omnibus alarum radix et squamulæ rufæ sunt puncto nigro.

Habitat Italiam Germaniam, N. ab E.—Angliam, Hiberniam, Ebrides Insulas.—In Anglia rarior esse videtur quum inter collectanea ditissima *F. Walkerii* nonnisi unicum exemplar obvium erat.— In Hibernia deprehendi fere gregarium per margines fluviorum plantis aquaticis insidentem.

Adnot.—Altera species *R. mutuator*, N. ab E. Monogr. I. 221.
No. 29. mihi invisa Germaniam habitat.

Explicit Genus Rogas.^b

ART. XII.—*Some Scraps by the Author of the Delta Letters.*

THE early historians of the conquest, or rather the destruction of America, present us but too often with little, save details of horrid atrocities committed on those harmless, innocent lambs (as the truly excellent Bishop of Chiassa calls them) the native Americans. How heart-rending are these details!

The hand that mingled in the meal,
At midnight drew the felon steel,
And gave the host's kind breast to feel
Meed for his hospitality.

The friendly hearth which warmed that hand,
At midnight armed it with the brand
That bade destruction's flames expand
Their red and fearful blazonry.

Then woman's shriek was heard in vain ;
Nor infancy's unpitied plain,
More than the warrior's groan, could gain
Respite from ruthless butchery.

^b The characters of the Subgenus *Heterospilus*, which should be in connexion with the foot-note in page 47, have been misplaced in printing.